Bloeddruk verhogen met medicijnen (inotropica)

IC /CCU/ EHH
040 286 4190

Wanneer jouw bloeddruk (plotseling) daalt door aandoeningen of een ongeval, is er sprake van een ernstige tot gevaarlijke situatie. Daling van jouw bloeddruk kan ontstaan door bloedverlies na letsel of na een operatie, door vochtverlies bij brandwonden, ondervoeding en uitdroging, hartritmestoornissen en bloedvergiftiging.

Een lage bloeddruk is meestal ook een van de redenen waarom je wordt opgenomen op een afdeling met intensieve zorg. Voor jouw herstel is namelijk snel een adequate behandeling van de bloeddrukdaling vereist.

De behandeling van de lage bloeddruk bestaat allereerst uit toediening van vocht via een infuus in jouw bloedbaan, zodat de hoeveelheid vocht (bloed) in de bloedvaten op een adequaat niveau komt. Als deze behandelwijze de bloeddruk niet doet stijgen of als jouw lichaam grote hoeveelheden extra vocht niet aan kan, is toediening van drukverhogende medicijnen noodzakelijk.

Bloeddruk verhogen met medicijnen in het Anna Ziekenhuis

Op de afdeling intensive care & coronary care unit (IC/CCU) in het Anna Ziekenhuis in Geldrop behandelen onze artsen een bloeddrukdaling zo nodig met drukverhogende geneesmiddelen. Er zijn diverse soorten medicijnen die tot effect hebben dat de bloedvaten wat samenknijpen. Dit samenknijpen verhoogt de druk in de bloedvaten waardoor de algehele bloeddruk weer stijgt. Deze medicijnen zijn niet zonder bijwerkingen en kunnen bijvoorbeeld het hart extra belasten, waardoor ritmestoornissen kunnen ontstaan. Om die redenen zullen onze artsen op de IC en de CCU bij de behandeling met inotropica altijd naar een balans zoeken waarbij je baat hebt bij de dosering medicijnen, maar zo min mogelijk last krijgt van bijwerkingen.

Wil je deze informatie online bekijken ga dan naar
www.annaziekenhuis.nl/medische-informatie/icc900-bloeddruk-verhogen-met-medicijnen-inotropica/
Of scan met je telefoon of tablet de QR-code.

ICC900
27-03-2024