

Leefregels na een operatieve behandeling bij niet-ingedaalde of gedraaide testis (orchidopexie/torsio testis)

Leefregels na een operatieve behandeling bij niet-ingedaalde of gedraaide testis

- Dag van de operatie bedrust en vloeibaar tot zacht eten geven.
- De hechtingen zijn zelf oplosbaar en hoeven niet verwijderd te worden.
- Twee dagen niet naar buiten.
- Na twee tot vier dagen naar school.
- Twee weken niet fietsen, sporten of gymnastiek.
- Na 2 dagen douchen, niet baden.
- Kleine kinderen niet in de zandbak laten spelen.
- Medicijnen; géén aspirine of sinaspril geven. Dit geeft een verhoogde kans op nabloeding.
- Wij geven jou het advies de eerste 24-uur na de ingreep op vaste tijden pijnmedicatie toe te dienen. De pijnmedicatie voor thuis kan na ontslag af worden gehaald bij de apotheek.

Wat te doen bij problemen?

Bij ontslag uit het ziekenhuis is het van groot belang te weten hoe je thuis bij problemen kunt handelen. Mochten zich thuis onverhoopt problemen voordoen die mogelijk te maken hebben met het ziekenhuisverblijf, operatie of behandeling, dan kun je contact opnemen met:

Tijdens kantooruren:

Polikliniek urologie, telefoonnummer: 040 - 286 48 65

Voor 08.30 uur, na 17.00 uur in het weekend:

Spoedeisende hulp, telefoonnummer : 040 - 286 48 34

Je hoeft je dan dus niet eerst tot de huisarts te richten

Wil je deze informatie online bekijken ga dan naar
www.annaziekenhuis.nl/medische-informatie/kin041-leefregels-na-een-operatieve-behandeling-bij-niet-ingedaalde-of-gedraaide-testis-orchidopexietorsio-testis/
Of scan met je telefoon of tablet de QR-code.



KIN041
11-02-2023