Mammalokalisatie markering van een afwijking in borst en/of oksel met jodiumzaadje

Het is belangrijk dat je deze informatie aandachtig doorleest. Hierdoor kun jij je goed voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat.

Wat is een mammalokalisatie

Jouw behandelend chirurg heeft met jou besproken dat in jouw borst en/of oksel een radioactief jodiumzaadje geplaatst zal worden. Dit zaadje markeert de precieze plaats van de afwijking in jouw borst en/of oksel. Dit wordt ook wel lokalisatie genoemd.

Er kunnen twee redenen zijn om een jodiumzaadje te plaatsen.

1. De afwijking in de borst is niet goed voelbaar.
2. Voorafgaand aan de operatie vindt een chemotherapie behandeling plaatsvindt (neo-adjuvante chemotherapie). Door deze behandeling kan de afwijking zoveel kleiner worden, dat deze niet meer voelbaar is en/ of niet meer zichtbaar met mammografie, echografie of MRI.

Voorbereiding

- Als je bloedverdunners gebruikt, bespreek dit dan vooraf met jouw chirurg. Het kan zijn dat je tijdelijk met deze medicijnen moet stoppen.
- Gebruik op de dag van de afspraak geen bodylotion op jouw bovenlichaam.
- Je kunt jouw normale kleding dragen. Voor het onderzoek zal de laborant jou vragen jouw bovenkleding uit te doen.
- Wij raden je aan jouw sieraden thuis te laten.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als je door ziekte of om andere redenen verhinderd bent om naar jouw afspraak te komen, vragen wij jou zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling radiologie.

Het plaatsen van het jodiumzaadje

Waar vindt de procedure plaats

De procedure vindt plaats op de afdeling radiologie en wordt uitgevoerd door een radioloog. De afdeling radiologie bevindt zich in het souterrain, route 22.

De procedure

Je ligt op jouw rug op de onderzoekstafel. De radioloog brengt de afwijking in beeld met behulp van echografie.

De huid van de borst en/of oksel wordt plaatselijk verdoofd, waarna het radioactieve zaadje met behulp van een naald onder echogeleide in de afwijking wordt gebracht. De naald wordt uit de borst of oksel gehaald, het jodiumzaadje blijft achter en er wordt een pleister geplakt op het wondje.

Om vast te leggen dat het jodiumzaadje is geplaatst, worden er röntgenfoto's gemaakt. Het jodiumzaadje kan niet meer verschuiven.

Ondanks de verdoving kan de procedure soms toch nog pijnlijk zijn.

Duur van het onderzoek

De procedure duurt ongeveer 15 minuten.

Risico’s en complicaties

Soms ontstaat een bloeduitstorting, die na verloop van tijd weer verdwijnt. Heel zelden ontstaat een ontsteking.
Het radioactieve jodiumzaadje is niet gevaarlijk voor jou of jouw omgeving en kan zonder enige

problemen, in jouw borst en/of oksel blijven zitten. Het jodiumzaadje wordt tijdens de operatie samen met de afwijking verwijderd.

Wanneer moet je contact opnemen

Het is belangrijk om bij koorts, roodheid, zwelling van de borst en/of oksel contact op te nemen met jouw behandelend specialist.

Tot slot

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heb je nog vragen over de procedure, neem dan contact op met de afdeling radiologie. Met medische vragen kun je terecht bij jouw behandelend specialist.

Aan het begin van het onderzoek zal de laborant je nog een keer vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer je op dat moment nog vragen hebt, kun je deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers

Anna Ziekenhuis algemeen:	040 - 286 40 40
Afdeling radiologie:	040 - 286 48 32
Poli chirurgie:	040 - 286 48 72

Wil je deze informatie online bekijken ga dan naar
www.annaziekenhuis.nl/medische-informatie/rad014-mammalokalisatie-markering-van-een-afwijking-in-borst-enof-oksel-met-jodiumzaadje/
Of scan met je telefoon of tablet de QR-code.

RAD014
20-09-2023